

# Une saison d'herbe plutôt favorable, mais surtout très contrastée

Excellente dans le Trégor, plutôt bonne dans le Mené, mais moyenne dans le Centre Bretagne, voire plutôt moyenne dans le Goelo ou sur la zone côtière... L'année 2008 ne restera pas dans la mémoire des herbagers. Retour sur la saison d'herbe ce printemps et cet été dans différentes fermes du département.

## Lecture des tableaux

Toutes les données sont mises en forme par les éleveurs.

On suit dans les tableaux le circuit des vaches laitières ou des vaches allaitantes (sauf indication contraire). L'intervalle entre deux pâturages est un intervalle moyen (entre la sortie et l'entrée dans le paddock) calculé à partir du planning de pâturage ; pour les laitiers, la production moyenne par jour et par vache est calculée à partir des données de la laiterie (et le nombre de vaches traites) ou du contrôle laitier. La ligne « tour d'herbe » indique les surfaces fauchées du circuit des vaches.

### Pierre-Yves Aignel, Plessala, Mené

34 ha de SAU, dont 29 ha d'herbe - 220.000 litres de lait  
25 ha d'herbe pour 45 vaches, soit 55 ares par VL  
12,5 ha fauchés sur le circuit des vaches  
Des vélagés toute l'année, avec deux grosses périodes, juillet-août et septembre-octobre.



Chez Pierre-Yves Aignel à Plessala, le plus dur c'est au printemps. « Il y a beaucoup de refus. J'ai mis les taries à gratter derrière les vaches, et j'ai passé la barre de coupe ou le giro sur 2 ou 3 hectares. On a intérêt à le faire, la repousse est meilleure ». Après les coupes à foin de juin, la repousse a été rapide (35 jours) : « le foin a été coupé jeune, au stade ensilage avancé... Et puis il s'agit de prairies complexes jeunes, qui me semblent repousser plus vite qu'un RGA-TB classique ». Tout au long de la saison d'herbe, les vaches ont consommé beaucoup de foin : « si elles en ont mangé,

estime Pierre-Yves, c'est qu'elles en avaient besoin. Avec le foin, j'espère aussi mieux valoriser la ration d'herbe ».

	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	septembre
Intervalle moyen entre deux pâturages	35 jours en moyenne mais cela varie de 30 à 50, parce que c'était mouillé	30 jours en moyenne	32-35 jours en moyenne	35-40 jours après réintroduction des parcelles fauchées	35-40 jours	35-40 jours
Alimentation des vaches / complémentation	les vaches sont dehors nuit et jour à partir du 2 avril. Elles ont 3-4 kg de maïs jusqu'au 10 avril, et du foin.	du foin, comme toute l'année. Une consommation moyenne de 2kg / VL et par jour en cette période	2 kg de foin	3-4 kg de foin	3-4 kg de foin	3-4 kg de foin 1 kg de mélange céréalière (grain) depuis le 5 septembre
Production moyenne de lait / VL	23 litres / jour	22 litres / jour	19 litres / jour	19-20 litres / jour	19 litres / jour	22 litres / jour
Tour d'herbe	25 ha pour 45 VL	0,50 ha fauchés le 19 mai	9,5 ha fauchés (6 et 24 juin)	retour sur des fauches à partir du 10 juillet (35 jours de repousse)	2,5 ha fauchés (début et fin août)	retour sur les fauches d'août (37 jours d'intervalle)

### GAEC Langren, Plouaret, Trégor

80 ha de SAU, dont 65 ha en herbe - 330.000 litres de lait - 58 vaches Holstein  
32 ha d'herbe dans le circuit des vaches, soit 55 ares par VL

21 ha fauchés sur le circuit des vaches  
Des vélagés toute l'année avec deux grandes périodes de vélagés : février et octobre-novembre



"A partir du 15 mai, les parcelles sont fauchées avant le pâturage, une fois dans l'année, pour mieux faire vieillir les pâturages et mieux gérer l'épiaisement". Les Le Fustec fauchent donc le paddock entier (en général des paddocks pour trois jours) avant l'entrée des vaches. Pas de fil avant, les vaches accèdent à l'ensemble du paddock.

En tout, le GAEC a fauché cette saison 32 hectares d'herbe, et fait 405 rounds de foin : "Notre chargement est trop faible. Nous allons réduire la surface en herbe".

	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	septembre
Pluviométrie (en mm)	78	121	34	72	57	
Intervalle moyen entre deux pâturages	selon les parcelles : 26 jours, 20 jours, 18 jours, 9 jours début mars (dès le 5, puis le 10) : les parcelles de réserve sont sorties du circuit. Les vaches tournent seulement sur les parcelles qui seront fauchées en juin	59 jours le 4 mai : entrée dans la parcelle de réserve qui a deux mois de repousse. Tout mai elles seront dans les parcelles de réserve.	35 jours	38 jours	33 jours puis réintroduction progressive des parcelles fauchées en juin (avec 55 jours de repousse) allongement des intervalles vers 45 jours ensuite	Les VL commencent à gagner sur l'herbe. Des stocks sur pied jusqu'à décembre, avec apport de foin à partir d'octobre
Alimentation des vaches / complémentation	Betteraves foin concentrés	Arrêt de la betterave le 5 mai arrêt du foin et des concentrés le 15 mai	herbe seule	herbe seule	herbe seule	herbe seule
Production moyenne de lait / jour / VL	23 litres/jour	20 litres / jour	21 litres / jour	17,6 litres / jour	17 litres / jour	
Tour d'herbe			21 ha fauchés en tout (du 18 au 30 juin)			
TB / TP	35,8 / 31	36,5 / 30,7	37,5 / 29,8	38,6 / 31	39,3 / 30,9	